

**Noctule de Leisler**  
***Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)**

**Protégée**

Annexe IV Directive Habitats/Faune/Flore  
Liste Rouge France : NT  
Liste Rouge Auvergne : LC




**Ecologie et conservation**

La Noctule de Leisler est l'une des chauves-souris d'Europe qui effectue les plus longues distances en migration (jusqu'à 1600 km), bien qu'elle soit la plus petite des trois Noctules européennes. C'est une espèce forestière avec une nette préférence pour les massifs à essence caduques assez ouverts comme les châtaigneraies et les chênaies, mais elle fréquente également les bois de résineux, en particulier en altitude. Elle recherche également la proximité des zones humides : eaux calmes même fortement eutrophisées, étangs forestiers, rivières, fleuves, lacs. En hiver comme en été, elle s'abrite souvent dans des cavités d'arbres, mais peut s'adapter aux constructions humaines: dessous de toitures, linteaux de grange. En raison de ses mœurs arboricoles, elle est difficile à observer, ce qui explique probablement les faibles densités généralement enregistrées.

**Répartition globale**

La Noctule de Leisler est présente dans toute l'Europe. Cette espèce a été observée à Madère, Tenerife et La Palma, et enregistrée au Maroc et en Algérie. D'autre part, elle est absente du sud de l'Italie et de l'Espagne orientale.

**Répartition régionale**



En Auvergne, la Noctule de Leisler la plus abondante des trois Noctules est connue dans les quatre départements auvergnats. Elle fréquente régulièrement les secteurs d'altitude et semble particulièrement présente dans les forêts de plaine de l'Allier. Le Val d'Allier est une zone favorable.

**Résultats de l'étude**

**La Noctule de Leisler, pourtant plus « courante » que la Noctule commune a été relativement discrète lors de l'étude. Elle a seulement été contactée lors du passage de juin, en chasse à moyenne altitude au-dessus de l'Aumance, à la station « fructicée ».**

